

PROFILASSI ANTIALLERGICA CONSIGLIATA PER LA SOMMINISTRAZIONE ENDOVENOSA DI MEZZO DI CONTRASTO

- 12 ore prima dell'esame: assumere 2 compresse di PREDNISONONE da 25 mg (es: DELTACORTENE)
- 5 ore prima dell'esame: astenersi dall'assunzione di alimenti
- 2 ore prima dell'esame: assumere 2 compresse di PREDNISONONE da 25 mg (es: DELTACORTENE)
- 1 ora prima dell'esame: assumere 1 compressa di ANTISTAMINICO (es: CETIRIZINA)

Avvertenze: Possibili effetti indesiderati

- alterazioni del bilancio idro-elettrolitico;
- alterazioni muscolo scheletriche, quali osteoporosi, fragilità ossea, miopatie;
- complicazioni a carico dell'apparato gastrointestinale, che possono arrivare fino alla comparsa o attivazione di ulcera peptica;
- alterazioni cutanee, quali ritardi nei processi di cicatrizzazione, assottigliamento della pelle e fragilità della cute;
- alterazioni neurologiche quali vertigini, cefalea ed aumento della pressione endocranica;
- interferenza con la funzionalità dell'asse ipofisi-surrene;
- complicazioni di natura oculistica quali cataratta posteriore subcapsulare ed aumentata pressione endoculare;
- negativizzazione del bilancio dell'azoto;
- picchi iperglicemici specie in pazienti con diabete mellito

Ai pazienti con anamnesi positiva per patologia gastrica si suggerisce di assumere un protettore gastrico (es: OMEOPRAZOLO)

NB: tutte le preparazioni prevedono l'uso di medicinali, pertanto è necessario consultare il proprio medico di famiglia prima di assumere qualsiasi farmaco o in caso di dubbi

